

ÉTUDIANTS ET UNIVERSITAIRES, CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LA VARIOLE DU SINGE

Le virus de la variole du singe circule actuellement en France, et particulièrement en Île de France.

MONKEYPOX

TRANSMISSION

Le virus se transmet lors de contacts très rapprochés avec les boutons ou les croûtes de la peau d'une personne malade, par le partage de linge ou de matériel de toilettes.

La toux et l'éternuement peuvent également transmettre la maladie.

Les rapports sexuels, avec ou sans pénétration, constituent aussi un risque important de transmission.

Une personne malade peut être contagieuse dès l'apparition des symptômes et jusqu'à disparition des croûtes (15 à 21 jours).

EN CAS DE
SYMPTÔMES



Isolez-vous
et contactez
votre médecin
ou appelez
le 15

SYMPTÔMES

Si vous pensez avoir été exposé, surveillez l'apparition des symptômes suivants :

- boutons sur le visage, les paumes des mains, les plantes des pieds, les organes génitaux, le buste ou les membres,
- fièvre,
- maux de tête,
- maux de gorge,
- douleurs musculaires,
- fatigue,
- ganglions douloureux.

La maladie guérit toute seule en 3 semaines environ, de rares cas nécessitent une hospitalisation.

En cas de symptômes, informez vos contacts proches et partenaires et isolez vous pendant toute cette durée.

MONKEYPOX

Si vous pensez être concerné par une exposition à risque **parlez-en à votre médecin**, votre centre de santé (Service de Santé Universitaire) ou **consultez un des 29 CeGIDD de l'Île de France**.



Un vaccin, post-exposition ou préventif, existe et est largement disponible gratuitement dans plus de **40 centres en Île de France**. Scanner le code ci-contre pour trouver la liste et les modalités de rendez-vous.



Variole du singe : **conseils et prise en charge** en Île-de-France



Sur sexosafe.fr : **Information** sur la variole du singe



**POUR TOUTE QUESTION CONTACTEZ
LA LIGNE INFOSERVICE 0801 90 80 69**

(Appel gratuit depuis un poste fixe de 8h à 23h 7J/7)

Pour en savoir plus : iledefrance.ars.sante.fr

