



Vanesse Vulcain




Cucullie



Callimorphe


Cléopâtre




Vanesse Paon de jour




Mars



Machaon




Apollon



Hespérie



Ne m'attrape pas si tu peux !




Argus

Thais




Sphinx



Smérinthe




Ecaille




Catogramme



Argemme



Ixias




Cupidon



Éryx



Héliconie




Talicate



UNE ANIMATION DU CRIPS ÎLE-DE-FRANCE

Hélicopis



Uranie



Pieride




Trimène



Eucharie



Priam



Éléusine



Mésosémie



Armandie



Papillon de Children

H. Demoulin Sc

Hubert

Règles du jeu

L'animation *Ne m'attrape pas si tu peux !* prend place dans un jardin féérique, fleuri et plein de papillons. L'objectif est de sensibiliser et d'informer les festivaliers sur les papillomavirus et de faire de la prévention sur les cancers HPV-induits.

Les publics

- Les jeunes en âge de se faire vacciner contre les HPV (11/19 ans).
 - Les parents (35/50 ans).
- L'espace d'animation permet de mener 2 parties en simultanée.

Le matériel

- 1 cahier jaune (public jeune),
- 1 cahier bleu (public parent),
- 6 épauettes,
- 1 cage à oiseaux,
- 1 chrono.

Étape 1

- Les participants sont accueillis par l'animateur ou l'animatrice dans le Jardin aux papillons.
- Une épauette leur est remise et ils sont invités à batifoler dans le jardin en attrapant les papillons (aimantés ou non) disposés un peu partout dans l'espace.


- L'animateur ou animatrice lance le chrono (15 et 30 secondes max).
- Le nombre total de papillons attrapés équivaut au nombre d'affirmations auxquelles les festivaliers devront répondre. Selon l'âge des participants, l'animateur ou animatrice pose les questions du cahier jaune ou bleu.

Étape 2


- Les participants sont invités à s'installer sur un banc ou un transat pour répondre aux questions posées par l'animateur ou animatrice.
- Les papillons récupérés dans l'épauette représentent les papillomavirus attrapés très facilement, comme c'est le cas de cette infection très virale.
- Désormais, les festivaliers doivent s'en débarrasser en répondant correctement aux affirmations issues du cahier.
- Une fois la ressource de papillons épuisée, les participants repartent chacun avec un « bon pour un cadeau / un makeup ».

À noter, les 19 affirmations, présentes dans ce cahier, sont chacune accompagnée d'un complément d'information et éventuellement, de pistes de relance.

Vanesse Vulcain




Cucullie




Callimorphe

Cléopâtre




Vanesse Paon de jour


Mars



Machaon



Apollon



Hespérie



Dans un rapport sexuel, je peux changer d'avis à tout moment.

Thaïs



Cat



Cupidon



Jolie




Ilcide



Trimène



Papillon Polycène



Hélicopis




Uranie




Piéride



Eucharie



Priam



Papillon de Children



Éléusine


Armandie



H. Demoulin Sc

Vrai

Aborder les notions
de consentement,
d'autodétermination,
de confiance
et de bienveillance



Les préservatifs
 protègent
 partiellement
 des papillomas.



Thais



Cat




Cupidon



Jolie




Ilcide




Vrai

Les papillomavirus étant une IST manu portée (transmission lors de rapports buccogénitaux et pénétrations digitales), le préservatif ne suffit pas pour s'en protéger d'où l'importance d'une prévention primaire, la vaccination.

IST très virale



Les papillomas concernent seulement les ados.




3

Millet

Papillon de Children
H. Demoulin Sc

faux

En grande majorité des cas, le papillomavirus s'attrape à l'adolescence lors des premiers rapports intimes. C'est plus tard, à l'âge adulte, que des lésions précancéreuses et des cancers peuvent être diagnostiqués. Les papillomavirus concernent les jeunes mais aussi les adultes, d'où l'importance d'une prévention secondaire, c'est à dire les dépistages (frottis et test HPV).



Avoir mal
pendant
ses règles,
c'est normal.



Thaïs



Cat




Cupidon



Jolie




Ilcède





faux

Sensibiliser sur l'endométriose,
SOPK (syndrome des ovaires
polykystiques).

Important
de normaliser les règles
mais pas les douleurs de règles.



Si on a un papillomavirus persistant, on peut développer un cancer de la gorge.




Vrai


Les cancers HPV des voies
aérodigestives supérieures
(quand ce n'est pas lié à
la consommation tabac/alcool)
représentent :

1 200 cancers/an – hommes
400 cancers/an – femmes.

Cas Michael Douglas qui a fait
de la sensi car touché par
un cancer VADS lié à un HPV,
suite à un cunnilingus.




Il existe
un vaccin
contre
certains cancers.



Vrai

La vaccination HPV est efficace contre le développement des cancers HPV-induits (col de l'utérus, vulve, anus, pénis, voies aérodigestives supérieures rares) comme cela a été prouvé en Australie et au Portugal où cette vaccination est obligatoire.

Par ailleurs, la vaccination contre l'hépatite B a été rendue obligatoire pour les nourrissons depuis 2018 et protège contre le cancer du foie.




Il existe des
centaines de souches
de papillomas, dont
celle à l'origine des
verrues plantaires.




Vrai

Il existe à peu près 200 souches de HPV des plus banales et anodines aux plus persistantes et agressives.

Les verrues plantaires sont effectivement des papillomavirus.



Les papillomas
sont
bien souvent
sans symptôme.




Vrai

80% de la population sexuellement active est traversée par un papilloma.

Dans 90% des cas, le virus est évacué naturellement par le système immunitaire avant 25 ans.

C'est une infection très virale, anodine dans la grande majorité des cas et sans symptôme.



Les papillomas touchent surtout les parties génitales.



Thaïs



Cat




Cupidon



Jolie




Illicade




Vrai et faux

La plupart des cancers, lésions précancéreuses et condylomes liés aux papillomas se retrouvent sur les parties intimes (col de l'utérus, vulve, pénis, anus) mais aussi, sur les voies aérodigestives supérieures (gorge et bouche).




Les garçons
peuvent se faire
vacciner par un/
une sage-femme.




Vrai

La profession de sage-femme
est dédiée au suivi
gynécologique.

Cependant, les garçons
accompagnés de leurs mères
peuvent se faire vacciner par
un/e sage-femme (autre nom
pour le métier de sage-femme
= maïeuticien/maïeuticienne
(qui accouche)).




Il est interdit
de parler
papillomas à
son / sa partenaire.



faux

Parler d'IST et de dépistage
à son/sa partenaire
est une bonne chose
pour instaurer une relation
de confiance, bienveillante
et une certaine écoute.



Les papillomas
sont une infection
sexuellement
transmissible.



Thais



Cat




Cupidon



Jolie



Ilcide




Vrai

Les papillomavirus sont une infection sexuellement transmissible très fréquente.


80% de la population sexuellement active est traversée par un HPV.

Dans 90% des cas, le virus est évacué naturellement par le système immunitaire avant 25 ans.

Infection très virale, anodine dans la grande majorité des cas et sans symptôme.




Je peux me rendre
 dans un CeGIDD
 pour me faire
 vacciner contre
 les papillomas.



Vrai

Un CeGIDD est un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. Sur rdv, il est possible de se faire vacciner contre les HPV. Si la personne est mineure, elle doit avoir une autorisation parentale.

On peut aussi se faire vacciner chez le médecin généraliste, gynéco, sage-femme. À partir de la rentrée scolaire 2023, possibilité de se faire vacciner au collège (stratégie de généralisation de la vaccination HPV par l'Éducation nationale et la Santé).



Les papillomas
sont un sujet de
santé publique
national.



Thaïs



Cat




Cupidon



Jolie



Ilcide



Vrai


La couverture vaccinale HPV est très faible en France comparée aux autres pays d'Europe.

Moyenne nationale française :
filles = 45,8% / garçons = 6%.


En 2020, en Europe, la couverture vaccinale dépassait 50% dans 20 pays et 75% dans 11 pays dont le Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni.

Stratégie de généralisation de vaccination HPV pour tous les élèves de 5^e dans tous les collèges français à partir de septembre 2023 proposée par les ministères Santé et Éducation nationale, annoncée par Emmanuel Macron en février 2023.

Vanesse Vulcain




Cucullie



Callimorphe

Cléopâtre




Vanesse Paon de jour




Mars



Machaon



Apollon



Hespérie



Thais



Cat



Cupidon



Jolie



Élicade

Les personnes

LGBTQIA+


peuvent attraper
un papilloma.



Trimène



Papillon Polycène




Hélicopis



Uranie



Priam



Piéride



Éléusine

Papillon de Children


H. Demoulin Sc

15

Milob

Vrai

Les papillomavirus
n'ont pas de genre
ni d'orientation sexuelle,
ils concernent tout le monde.




Les préservatifs coûtent chers.




faux

Les marques
Eden et Sortez couverts
sont gratuites en pharmacie
pour les moins de 26 ans
depuis le 1^{er} janvier 2023.

Il s'agit exclusivement
des préservatifs externes.




100%
de la population
sexuellement active
prend le risque
d'attraper
un papilloma.




faux

La vaccination protège des HPV.




Se faire vacciner
 contre les papillomas,
 c'est se protéger
 et protéger
 les autres contre
 des cancers graves.



Vrai

Le vaccin empêche le virus de se propager et engage une forme d'immunité collective comme c'est le cas en Australie, où le vaccin HPV est obligatoire depuis 2007 (pour les filles) et 2013 (pour les garçons). Grâce à cette politique volontariste, le cancer du col de l'utérus y est en voie de disparation.



Le seul dépistage
 existant
 pour contrôler
 les papillomas
 est le frottis.



Thais



Cat



Cupidon




Jolie



Alcade



Trimène




Priam

Eucharie



Piéride



Papillon de Children

H. Demoulin Sc.



Éléusine

Millet

Vrai

Le frottis est recommandée
dès 25 ans.

Pour les autres cancers HPV-induits
et pour les hommes, il n'existe aucun
dépistage HPV.

Si le frottis est négatif, on propose
un test HPV (examen gynécologique
similaire au frottis) à partir de 30 ans,
à renouveler tous les 5 ans.

Aucun dépistage n'existe pour
les autres cancers (vulve, anus, pénis,
voies aéro digestives supérieures).

Visite chez le médecin à faire
régulièrement.

Sommaire

1. Dans un rapport sexuel, je peux changer d'avis à tout moment.
2. Les préservatifs protègent partiellement des papillomas.
3. Les papillomas concernent seulement les ados.
4. Avoir mal pendant ses règles, c'est normal.
5. Si on a un papilloma virus persistant, on peut développer un cancer de la gorge.
6. Il existe un vaccin contre certains cancers.
7. Il existe des centaines de souches de papillomas, dont celle à l'origine des verrues plantaires.
8. Les papillomas sont bien souvent sans symptôme.
9. Les papillomas touchent surtout les parties génitales.
10. Les garçons peuvent se faire vacciner par un/une sage-femme.
11. Il est interdit de parler papillomas à son/sa partenaire.
12. Les papillomas sont une infection sexuellement transmissible.
13. Je peux me rendre dans un CeGIDD pour me faire vacciner contre les papillomas.
14. Les papillomas sont un sujet de santé publique nationale.
15. Les personnes LGBTQIA+ peuvent attraper un papilloma.
16. Les préservatifs coûtent chers.
17. 100% de la population sexuellement active prend le risque d'attraper un papilloma.
18. Se faire vacciner contre les papillomas, c'est se protéger et protéger les autres contre des cancers graves.
19. Le seul dépistage existant pour contrôler les papillomas est le frottis.

Ne m'attrape pas si tu peux! est une animation sur les papillomavirus. Les papillomavirus ou HPV (*Human Papilloma Virus*) sont des IST très fréquentes : 80% de la population sera touchée par un HPV dans les premières années de sa vie sexuelle. Dans 90% des cas, le virus est évacué naturellement par le système immunitaire et est asymptomatique. Mais dans 10% des cas, le virus est persistant et est à l'origine de condylomes (verrues génitales) et de cancers : col de l'utérus, vulve, anus, pénis, voies aérodigestives supérieures (gorge et bouche). Une prévention primaire existe afin de se protéger contre les virus des HPV : la vaccination, recommandée pour les filles et les garçons de 11 à 19 ans (rattrapage possible pour les HSH jusqu'à 26 ans). À travers cette animation, nous souhaitons sensibiliser les jeunes en âge de se faire vacciner et leurs parents.

